

MASTERSil®

MASTERSil®

MASTERSil®

CZ / OXI TABLET 200 g

Charakteristika: MASTERSil® OXI – Tablet, jsou tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny pro průběžné ošetření bazénové vody. Postupně se rozpouští bez zápachu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, nůsobilí mímě kysle a tím lépe snižují hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje likvidaci běžné se vyskytujících bakterií a řas. **Návod k použití:** Díky nepřítomnosti zápachu jsou vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve vírivkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku přebytkého kyslíku je možné se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem. Používajte spoločne s MASTERSil® OXI Sok granulát, MASTERSil® Krištál, MASTERSil® Algigid, MASTERSil® pH+ a pH- pro komplexní úpravu bazénové vody. **Dávkování:** Tabletů vložte do plaváku nebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně 3-6 dnů (dle teploty a zatížení – čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pro ošetření cca 1m³ vody, 200g tableta pro cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíku měřte testem a udržujte ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Při vyšším zatížení bazénu (vyšší teploty, počet koupajících se, znečištění, ...) doporučujeme kombinovat s MASTERSil® Algigid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (sírán) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). **Standardní věty o nebezpečnosti:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/sprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **První pomoc:** Při nadýchání: Postiženého přenechte na čerstvém vzduchu. Při potížení vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži oplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodělané je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevylávejte zvracení. Nepodávejte uhlíkatý/hydrogenuhlíkatý (sodu/jedlou sodu). Okamžitě vylejte lékařskou pomocí zdravotnickém zařízení. **Skladování:** Skladujte v uzavřených, originálních obalech, v suchu a dlechu, v dobře větraných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetete, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby / expirace:** Uvedeno na obalu výrobku. **Používejte biocidní přípravky bezpečně.** Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro neprofesionální použití.

OXI Tablet 200 g



Pro průběžnou úpravu vody
v bazénech

ŽÁDNÝ CHLOR – POUZE AKTIVNÍ KYSLÍK

1 kg

SK / OXI TABLET 200 g

Charakteristika: MASTERSil® OXI – Tablet, sú tablety na báze aktívneho kyslíka. Sú určené pre priebežné oštiepenie bazénovej vody. Postupne sa rozpúšťa bez zápachu. Môžno ich používať nezávisle na tvrdosti vody, nůsobilí mímě kysle a tým ľahšie znižujú hodnotu pH vody. Prítomnosť kyslíka zaručuje likvidáciu bežná sa vyskytujúcich baktérií a rias. **Použitie:** Vďaka neprítomnosti zápachu sú vhodné nielen pre úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo vírivkách a SPA. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytočného kyslíka je možné sa kúpať veľmi skoro po oštiepení bazénovej vody týmto prípravkom. Používajte spoločne s MASTERSil® OXI Sok granulát, MASTERSil® Krištál, MASTERSil® Algigid, MASTERSil® pH+ a pH- pre komplexnú úpravu bazénovej vody. **Dávkovanie:** Tabletu vložte do plaváku alebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačne 3-6 dní (podľa teploty a zaťaženia - čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pre oštiepenie cca 1m³ vody, 200g tableta pre cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíka merajte testermom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, pH hodnoty v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pri vyššom zaťažení bazéna (vyššie teploty, počet kúpajúcich sa, znečistenie, ...) odporúčame kombinovať MASTERSil® Algigid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (sírán) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). **Vystrážne upozornenie:** H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornenie:** P273 Zabraňte uvoľnenia do životného prostredia. P280 Použíajte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/štitový štít. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut ich opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára. **Prvá pomoc:** Pri nadýchání: Postihnúťého přenešte na čerstvém vzduchu. Při problémoch vyhľadajte lekárske oštiepenie. Pri styku s pokožkou: Vyleťte kontaminovaný oděv. Postihnúťé miesto na koži omývajte veľkým množstvom vody aspon 15 minút. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených viečkach vodou po dobu najmėne 15 minút. Vyhľadajte lekárske oštiepenie. Při požití: Nevylávejte zvracanie. Nepodávejete uhlíkatý/hydrogenuhlíkatý (sodu/jedlou sodu). Okamžite vyleťte lekárskou pomoc v zdravotníckom zariadení. **Skladovanie:** Skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných miestach, oddelene od potravín a krmív, mimo zdroja tepla, ohňa a hořlavých látok. **Údaje pro dekontaminaci:** V prípade rozsypania tablety smetete, zabraňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Upozornenie:** Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakládáním s prípravkom. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby při uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Datum výroby/expirácie:** Uvedené na obale výrobku. **Používejte biocidne výroby bezpečne.** Před použitím si vždy přečtajte údaje na obale a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro neprofesionálne použitie.



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk